


Figure 3. Treatment of iron reactions. Reprinted from Rampton et al³⁶ with permission.

Εξετάζετε ο ασθενής για τυχόν προϋπάρχοντα εξανθήματα. ΖΣ προ της έγχυσης , 5 λεπτά μετά την έγχυση και στο τέλος της έγχυσης

Στην 1η δόση ο ασθενής μένει υπό παρακολούθηση για 1 ώρα. Στις επόμενες δόσεις ο ασθενής μένει υπό παρακολούθηση για 30 λεπτά



ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΤΗΛ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ :Ζάλη, λιποθυμία, δυσκαμψία άκρων προσώπου, πόνος στο στήθος-οσφύ, αρθραλγία, πυρετός , ρίγος, εξάνθημα, αγγειονευρωτικό οίδημα , λεμφαδένες

1. [The safety of intravenous iron preparations: systematic review and meta-analysis.](#) Avni T, Bieber A, Grossman A, Green H, Leibovici L, Gafter-Gvili A.
2. Auerbach M, Deloughery T. Single-dose intravenous iron for iron deficiency: a new paradigm. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016 (1) 57-66