

Πρωτόκολλα ΝΕΙΜ ΓΟΝΚ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ιούλιος 2014

ΕΓΓΡΑΦΟ 10: ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η Μετάγγιση ΣΕ πρέπει να αρχίζει εντός **30 λεπτών** από την απομάκρυνση του παραγώγου από την Αιμοδοσία και να ολοκληρώνεται εντός **4 ωρών**.

-Συνιστώμενος ρυθμός μετάγγισης για τα ΣΕ: 2-5ml

(6-15 σταγόνες)/λεπτό.

-Τα αιμοπετάλια και το πλάσμα πρέπει να χορηγούνται με ρυθμό 5ml/λεπτό **(15 σταγόνες)** για τα πρώτα **15 λεπτά** και στη συνέχεια αν δεν παρουσιαστεί ανεπιθύμητη αντίδραση χορηγούνται με ρυθμό που ανέχεται ο ασθενής.

-Για το πλάσμα ή μια θεραπευτική δόση αιμοπεταλίων (4-6 μονάδες),η διάρκεια πρέπει να είναι περί τα **50 λεπτά** .

-Όλες οι συσκευές μετάγγισης είναι σχεδιασμένες για να χορηγούνται **2-4 μονάδες παραγώγων σε διάρκεια 4 ωρών**. Αλλάζουν αν λήξει κάποια από τις προϋποθέσεις.

-Τα αιμοπετάλια πρέπει να χορηγούνται πάντα πρώτα.

-Αν χρειασθεί αλλαγή συσκευής αφήνεται η 1^η στην θέση της **κλειστή** και εισάγεται 2^η συσκευή στην **2^η πύλη εισόδου**.

-Ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται στενά κατά τα πρώτα 15 λεπτά της μετάγγισης, κάθε 30 λεπτά κατά τη διάρκεια της και τουλάχιστον 1 ώρα μετά το τέλος αυτής! Επίσης να ενθαρρύνεται ο ασθενής να αναφέρει τυχόν αντιδράσεις τις επόμενες 24 ώρες από την μετάγγιση.