


TACO Checklist

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝ

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ...



Αν ο ασθενής σας έχει:

- Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ)
- Σοβαρή στένωση αορτής
- Μέτριου ή σοβαρού βαθμού
- δυσλειτουργία αριστεράς κοιλίας
- Λαμβάνει τακτική διουρητική αγωγή



Αν ο ασθενής σας έχει:

- Διαγνωσμένο πνευμονικό οίδημα
- Αναπνευστική συμπτωματολογία αδιάγνωστης αιτιολογίας



Αν ο ασθενής σας έχει:

- Εκσεσημασμένα θετικό ισοζύγιο υγρών
- Χορήγηση υγρών ταυτόχρονα με τη μετάγγιση (ή κατά το τελευταίο 24ωρο)
- Περιφερικά οιδήματα
- Υπολευκωματιναίμια
- Σημαντική έκπτωση νεφρικής λειτουργίας

1

Αναθεωρήστε την ανάγκη για μετάγγιση (τα αναμενόμενα οφέλη είναι περισσότερα από τους πιθανούς κινδύνους;)

2

Μήπως η μετάγγιση μπορεί να αναβληθεί με ασφάλεια, μέχρι να διερευνηθεί και να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του ασθενούς;

3

- Μεταγγίστε μία μονάδα ερυθρών και επανεκτιμήστε τα συμπτώματα της αναιμίας
- Μετρήστε το ισοζύγιο υγρών
- Εξετάστε το ενδεχόμενο προφυλακτικής χορήγησης διουρητικών
- Ελέγχετε τακτικά τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (και τον κορεσμό σε οξυγόνο)

TACO: TRANSFUSION ACUTE CIRCULATION OVERLOAD

(ΟΞΕΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ)